

# VEEL GESTELDE VRAGEN BIJ SCHISIS

## Operaties

Deze vragen zijn van toepassing op de periode rond een eerste operatie, het sluiten van de lip en/of het zachte gehemelte



**Schisis**  
Nederland 

## Moet ik na het sluiten van de lip littekencrème gebruiken voor de wondgenezing?

De eerste tijd na de operatie moet de wond rustig kunnen genezen en wordt afgeraden te smeren of masseren. Na een aantal weken mag het litteken gemasseerd worden (dit kan met gewone vaseline), maar het moet niet. Vraag binnen uw schisisteam naar specifieke adviezen voor uw kind.



## Hoeveel pijnstilling heeft mijn kind nodig na de operatie?



Dit hangt van uw kind af, sommige kinderen hebben meer nodig dan anderen. Als u denkt dat uw kind pijn heeft, mag u thuis paracetamol geven.

## Is het nodig dat de hechtingen verwijderd worden uit de lip of het gehemelte?

Nee, er zijn vaak nog wel hechtingen aan de buitenkant zichtbaar, maar deze zijn oplosbaar en hoeven niet verwijderd te worden.

*(Alleen bij team Noord (Groningen/ Leeuwarden) niet-oplosbare hechtingen gebruikt die verwijderd moeten worden.)*



## Wanneer mag mijn kind na de operatie aan lip en/of gehemelte weer uit de fles drinken?



Dit mag gelijk na de operatie van zowel de lip als het gehemelte. Soms hebben kinderen even tijd nodig om weer te gaan drinken. Als uw kind al gewend is aan een lepeltje, kan dat helpen bij de eerste hapjes/slokjes.

## Mag mijn kind vingers in de mond doen na de operatie aan lip of gehemelte?



Dat is geen probleem, bij veel krabben of peuteren kunt u eventueel sokjes over de handjes doen om te voorkomen dat hechtingen los gaan. (Sommige teams zien liever dat kinderen geen vingers in de mond doen, vraag dit na bij uw eigen schisisteam.)

## Het gehemelte gaat weer open, wat moet ik doen?

Als het gehemelte een klein beetje open gaat heeft dit meestal geen directe gevolgen, u hoeft dan niets te doen. Bij twijfel neemt u contact op met de contactpersoon van het schisisteam. Bij een forse bloeding kunt u 's avonds of in het weekend altijd terecht bij de spoedeisende hulp van uw ziekenhuis.

## Mijn kind heeft buisjes nodig, waarom is dat?

Vocht achter de trommelvliezen komt vaker voor bij kinderen met schisis, dit zorgt ervoor dat het gehoor tijdelijk slechter is. Goed kunnen horen is essentieel om goed te leren spreken.

Buisjes zorgen ervoor dat de ruimte achter het trommelvlies weer belucht wordt, dit verbetert het gehoor en voorkomt vochtophoping en oorontsteking.

